

# 經皮內視鏡胃造廔 術後之照護注意事項

## 一、名詞解釋

病人可能因某疾病發生吞嚥困難而需要管灌飲食，胃造廔為一個替代鼻胃管的方式，此為在胃及腹壁上做一造口，置入灌食管。

## 二、適用對象

1. 腦中風患者。
2. 頭頸部癌或食道癌治療後吞嚥困難。
3. 腦部病變或神經肌肉系統疾病而需長期置放鼻胃管者。
4. 無法放置鼻胃管之患者。

# 經皮內視鏡胃造廔 術後之照護注意事項

## 三、照護及注意事項

1. 術後 24 小時後請醫師評估腹部狀況開始灌食。
2. 造廔口疼痛會持續數天，可以給予適當之止痛藥物。
3. 術後每天以生理食鹽水清潔傷口周圍 1-2 次，再以優碘消毒，並以無菌紗布固定於造口處。
4. 每日檢查傷口有無紅腫、疼痛、或腫脹，若紗布有滲濕情形，應立即更換紗布，並保持傷口乾燥。
5. 灌食前及後，均以 30-50cc 開水沖洗管子。
6. 灌食中及灌食後一小時，應床頭抬高。

義大醫療財團法人 胃腸肝膽科 關心您的健康

聯絡資訊		
義大醫院 地址:高雄市燕巢區 角宿里義大路 1 號 電話:07-6150011 轉 5179	義大癌治療醫院 地址:高雄市燕巢區 角宿里義大路 21 號 電話:07-6150022 轉 6711	義大大昌醫院 地址:高雄市三民區 大昌一路 305 號 電話:07-5599123 轉 7541